

الجروح التي يسببها الفيتانيل مع زيلازين

ما هو الزيلازين؟

الزيلازين ("tranq") هو مهدئ للحيوانات أصبح شائعاً في إمدادات المخدرات غير المشروعة في جميع أنحاء البلاد. وهو يُخلط مع مخدرات الشوارع الأخرى، وخاصة الفنتانيل. مثل الفنتانيل، يمكن أن يسبب الزيلازين التخدير وفقدان الوعي وانخفاض التنفس والاعتماد. وعلى الرغم من أن النالوكسون لا يعمل على الزيلازين، إلا أنه يجب دائماً إعطاء النالوكسون لجرعة زائدة مشتبه بها - سيساعد ذلك إذا كان هناك فنتانيل أو أي مادة أفيونية أخرى. إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما قد تناول جرعة زائدة، فاعطي النالوكسون واتصل بالرقم 911. إذا كانوا لا يتنفسون، فابدأوا في التنفس لحين وصول المستجيبين للطوارئ.

يمكن أن تسبب الأدوية التي تحتوي على الزيلازين جروحاً يمكن أن تكبر بسرعة ويصعب علاجها.



الجروح المسببة من العقاقير التي تحتوي على زيلازين.

جروح الزيلازين

- قد تظهر إذا حقنتم أو دخنتم أو استنشقتهم الفنتانيل مع إضافة الزيلازين.
- يمكن أن تبدأ من أي مكان على جسمكم، خاصة على الذراعين أو الساقين أو اليدين أو القدمين. تفحصوا هذه المناطق مراراً بحثاً عن علامات الجروح الجديدة.
- يمكن أن تشكل الجروح أنفاقاً أو تنتشر إلى الأنسجة بالقرب منها. ويمكنهم أن تكون قشرة سميكة أثناء محاولتها الشفاء.
- يصعب الاعتناء بها أكثر من أنواع الجروح الأخرى.

كيفية العناية بالجروح

- نظفوا الجروح بالصابون والماء كل يومين أو ثلاثة على الأقل.
- ضعوا المرهم على قطعة شاش وضعه على الجرح بأكمله. غطوها بالمزيد من الشاش الجاف.
- لفوها بشاش جاف ونظيف وأمنوا مكانه بشريط لاصق. تأكدوا من أن اللف ليس ضيقاً جداً.
- غطوها بضمادة إيس أو الكوبان أو الأكمام/السراويل الطويلة.
- غيروا الضماد كل 1-3 أيام. راقبوا ظهور العلامات لطلب العناية الطبية

متى يجب طلب العناية الطبية

- عندما يبدأ الجرح بالظهور بشكل غير عادي (غامق، أسود، أحمر، حار، من الصعب لمسه، سميك، كريه الرائحة، مع إفراز أصفر/أخضر).
- إذا كانت لديك علامات للالتهاب: الحمى



